

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

P-Dragees blau Lichtenstein

überzogene Tabletten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss P-Dragees blau Lichtenstein jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen auftritt, Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist P-Dragees blau Lichtenstein und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von P-Dragees blau Lichtenstein beachten?
3. Wie ist P-Dragees blau Lichtenstein einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist P-Dragees blau Lichtenstein aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST P-Dragees blau Lichtenstein UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Anwendungsgebiete

Nach Angaben des Arztes.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON P-Dragees blau Lichtenstein BEACHTEN?

P-Dragees blau Lichtenstein darf nicht eingenommen werden

bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von P-Dragees blau Lichtenstein ist erforderlich

Keine besondere Vorsicht erforderlich.

Bei Einnahme von P-Dragees blau Lichtenstein mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bisher keine Hinweise auf Risiken bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von P-Dragees blau Lichtenstein

Dieses Arzneimittel enthält Lactose, Sucrose und Glucose. Bitte nehmen Sie P-Dragees blau Lichtenstein daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

3. WIE IST P-Dragees blau Lichtenstein EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie P-Dragees blau Lichtenstein immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Art der Anwendung

Überzogene Tabletten zum Einnehmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, daß die Wirkung von P-Dragees blau Lichtenstein zu stark oder zu schwach ist.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine Nebenwirkung auftritt, Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST P-Dragees blau Lichtenstein AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über + 25° C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was P-Dragees blau Lichtenstein enthält:

Jede überzogene Tablette enthält Lactose-Monohydrat; Magnesiumstearat (Ph.Eur.); mikrokristalline Cellulose; Sucrose (Saccharose); Glukose-Sirup; Maisstärke; hochdisperses Siliciumdioxid; weißer Ton; Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.); Arabisches Gummi; Montanglycolwachs; Povidon (K25); Talkum; Titandioxid; Calciumcarbonat; Macrogol 6000; Patentblau V, Aluminiumsalz.

Inhalt der Packung

Packungen mit 50 [N2] und 100 [N3] überzogenen Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Winthrop Arzneimittel GmbH

Urmitzer Straße 5

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 0180 / 20 20 010*

Fax: 0180 / 20 20 011*

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im **April 2009**

Apothekenpflichtig

* 0,06 €/Anruf